

スズメバチから見る 名古屋の環境

生態と人との関わり



2023年6月17日

ハチの分類

ハチの仲間（ハチ目）は、日本国内で約4,500種が記録されているが、大部分を他の昆虫などに寄生する寄生バチが占める。ほとんどのハチは、手で握ったりしないかぎり決して刺すことはない。

ハチ目	広腰類	ハバチ類・キバチ類		植物食
	細腰類	ヤドリバチ類		寄生・(植物食)
		有剣類	セイボウ上科	
			スズメバチ上科	
			アナバチ群	肉食
			ハナバチ上科	花蜜・花粉食
			ハナバチ群	

はじめに



- ハチの仲間について
- スズメバチについて
種類・生態・生活史
- スズメバチの特徴と見分け方について
- 名古屋のスズメバチ
- スズメバチと人との関わり
- スズメバチはなぜ刺すか
刺傷被害の実態・対処法・防止対策
- スズメバチは危険な虫か？
- まとめ

ハバチ類・キバチ類

● 巣を作らない ● 単独生活 ● 幼虫は植物食



ホシアシブトハバチ

ルリチュウレンジ

チュウレンジバチ

ヤドリバチ類

- 巣を作らない
- 寄生生活
- 幼虫は肉食（一部植物食）



マダラヒメバチ



オオホシオナガバチ



クヌギハマルタマバチ

有剣類 セイボウ上科 セイボウ科

- 巣を作らない
- 寄生生活
- 幼虫は肉食



オオセイボウ

セイボウ上科にはアリガタバチ科が含まれる。シバンムシアリガタバチは、畠の藁床から発生するタバコシバンムシに寄生し、人を刺して問題となることがある。



画像は名古屋市HPより転載

Deathwatch beetles

有剣類 スズメバチ上科 ツチバチ科

- 巣を作らない
- 単独生活
- 幼虫は肉食



キオビツチバチ



オオモンツチバチ



コモンツチバチ

有剣類 スズメバチ上科 クモバチ科

- 巣を作る
- 単独生活
- 幼虫は肉食



キオビクモバチ



オオシロフクモバチ

有剣類 スズメバチ上科 ドロバチ科

- 巣を作る
- 単独生活
- 幼虫は肉食



スズバチ

オオタオビドロバチ

ムモントクリバチ

有剣類 スズメバチ上科 スズメバチ科

- 巣を作る
- 集団生活
- 幼虫は肉食



セグロアシナガバチ

フタモンアシナガバチ

コガタスズメバチ

有剣類 ハナバチ上科 ミツバチ科 アナバチ群

- 巣を作る
- 単独生活
- 幼虫は肉食



キンモウアナバチ

クロアナバチ

サトジガバチ

有剣類 ハナバチ上科 ミツバチ科 ハナバチ群

- 巣を作る
- 単独生活
- 幼虫は花蜜・花粉食



オオハキリバチ

キムネクマバチ

タイワンタケクマバチ

有剣類 ハナバチ上科 ミツバチ科 ハナバチ群

- 巣を作る
- 集団生活
- 幼虫は花蜜・花粉食



セイヨウミツバチ

ニホンミツバチ

コマリハナバチ

スズメバチの種類数

区分	世界の種類数	日本の種類数
総数	67種	17種
スズメバチ属 <i>Vespa</i>	23種	8種
クロスズメバチ属 <i>Vespula</i>	22種	5種
ホオナガスズメバチ属 <i>Dolichovespula</i>	19種	4種
ヤミズズメバチ属 <i>Provespa</i>	3種	—

スズメバチとは

スズメバチ科スズメバチ亜科に属するハチの総称で、以下のような特徴を持っている。

アリも含めてハチ目の中では最も進化したグループで、**社会性の狩りバチ (social wasps)** と呼ばれる。

- 1 メスに繁殖をする個体（女王バチ）と繁殖をしない個体（働きバチ）の区分が存在する。
- 2 世代の重なりがある。
- 3 協同で子育てをする。


ミツバチ、マルハナバチの仲間は、社会性の花バチ (social bees) と呼ばれる。

日本のスズメバチ


スズメバチの種類	名古屋	北海道	本州	四国	九州	沖縄	備考
スズメバチ属 <i>Vespa</i>							
オオスズメバチ <i>V. mandarinia</i>	●	●	●	●	●		
キイロスズメバチ <i>V. simillima</i>	●	●	●	●	●		
コガタスズメバチ <i>V. analis</i>	●	●	●	●	●	●	
モンスズメバチ <i>V. crabro</i>	●	●	●	●	●		
ヒメスズメバチ <i>V. ducalis</i>	●		●	●	●	●	
ツマグロスズメバチ <i>V. affinis</i>							● 南西諸島に分布
チャイロスズメバチ <i>V. dybowskii</i> *	●	●	●				岡山・鳥取県以東に分布
ツマアカスズメバチ <i>V. velutina</i>						●	長崎県対馬に侵入布定着
クロスズメバチ属 <i>Vespula</i>							
クロスズメバチ <i>Vl. flaviceps</i>	●	●	●	●	●		
シタクロスズメバチ <i>Vl. shidai</i>	●	●	●	●	●		北海道以外では山地性
キオビクロスズメバチ <i>Vl. vulgaris</i>		●	●				北海道以外では山地性
ツヤクロスズメバチ <i>Vl. rufa</i>		●	●	●	●		北海道以外では山地性
ヤドリスズメバチ <i>Vl. austriaca</i> *		●	●				北海道以外では山地性
ホオナガスズメバチ属 <i>Dolichovespula</i>							
キオビホオナガスズメバチ <i>D. media</i>		●	●				北海道以外では山地性
ニッポンホオナガスズメバチ <i>D. saxonica</i>		●					
シロオビホオナガスズメバチ <i>D. pacifica</i>		●	●	●			山地性
ヤドリホオナガスズメバチ <i>D. adulterina</i> *		●	●				北海道以外では山地性

*印は社会寄生性の種

日本のスズメバチの分布状況



スズメバチの体の部位と名称



スズメバチの生活史

- いずれの種も巣活動は一年限りである。
- 春先に越冬を終えた女王バチが単独で巣作りする。
- 大部分の期間、巣にはメス（女王バチと働きバチ）しかいない。
- 秋にオスバチと新女王バチが誕生して、交尾の後、新女王バチだけが越冬する。
- 活動の時期は4月～12月であるが、巣活動期間は種によって異なる。アシナガバチは3月～10月

コガタスズメバチの一年

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
越冬期	女王バチが巣の場所さがし	女王バチが一匹で巣づくり・産卵・幼虫の世話ををする	女王バチと働きバチが共同で巣づくりや幼虫の世話ををする	働きバチがどんどん増え巣も大きくなる。巣の防衛本能が強くなり、巣に近づく人などへ攻撃をする		新女王と雄バチが交尾する	巣の中のハチは死んで巣はからになる。この巣は翌年は使いません	



スズメバチ3種の発育所要日数




卵

1歳～3歳幼虫

5歳幼虫

蛹

スズメバチ3種の発育所要日数



スズメバチの主な狩りの対象

	区分	主な餌資源
コガタ	何でも屋	各種の昆虫、特にハチ目
キイロ	何でも屋	各種の昆虫、特にハエ目、クモなど
ヒメ	専門家	アシナガバチの幼虫・蛹
モン	準専門家	セミを好む。バッタ、トンボなど
オオ	何でも屋	各種の昆虫、特に中型の甲虫類、イモムシなど、ハチの幼虫・蛹

スズメバチの採餌習性

- 幼虫の餌に各種の昆虫・クモなどを狩る。ヒメスズメバチはアシナガバチの巣を襲い、幼虫や蛹の体液を餌にする。

- 成虫の餌は炭水化物である。幼虫の分泌物の他、花蜜や樹液、果樹、アブラムシやカイガラムシの甘露なども利用する。

Keyword : 栄養交換



スズメバチの採餌習性 (幼虫の餌を狩る)



セイヨウミツバチを狩る
コガタスズメバチ

セイヨウミツバチを狩る
オオスズメバチ

ハエの仲間を狩る
キイロスズメバチ

スズメバチの採餌習性 (樹液・甘露)



アベマキの樹液
オオスズメバチ

レッドロビンの樹液
コガタスズメバチ

アブラムシの甘露
コガタスズメバチ

スズメバチの採餌習性 (花外蜜腺・果樹)



モッコウバラ (花外蜜腺)
コガタスズメバチ

イチジク
ヒメスズメバチ

ココスヤシ
コガタスズメバチ

スズメバチの採餌習性 (花蜜)



ヤブガラシ
コガタスズメバチ

ノブドウ
キイロスズメバチ

アレチウリ
モンスズメバチ

スズメバチの巣のしくみ



スズメバチの営巣場所

	開放空間		遮蔽空間			計	
	家屋等	樹木	家屋等	樹洞	地中		
コガタ	2413	9492	2			11907	
キイロ	100	11	93	1	1	206	
ヒメ			273	19	26	29	347
モン	8		193	54	3	28	286
オオ			2	25	109	6	142
チャイロ	1		2	1			4
クロ			1		6		7

※ 家屋等には人工の工作物を含む


コガタスズメバチ

Vespa analis



● 開放空間に営巣

スズメバチ8種の検索表



キイロスズメバチ

Vespa simillima



● ● 開放空間・閉鎖空間のいずれにも営巣

ヒメスズメバチ

Vespa ducalis



● 閉鎖空間に営巣

モンスズメバチ

Vespa crabro



● ● 閉鎖空間・まれに開放空間にも営巣

オオスズメバチ

Vespa mandarinia



● 閉鎖空間に営巣

チャイロスズメバチ

Vespa dybowskii



Keyword : 社会寄生

● ● 閉鎖空間・まれに開放空間にも営巣

ツマアカスズメバチ *Vespula velutina*



● 開放空間に営巣

巣の画像 : A氏撮影

クロスズメバチ *Vespula flaviceps*



● 閉鎖空間に営巣


名古屋のスズメバチ事情

- 8種のスズメバチが生息する（同所的共存）
活動時期・営巣場所・餌資源を異にする
- コガタスズメバチが圧倒的に多く、キイロスズメバチが少ない
- モンスズメバチが多い
- チャイロスズメバチが生息する
- 分布には大きな地域差がある




スズメバチ駆除件数の推移

1983 - 2007




名古屋市で駆除したスズメバチの種構成




この5種の他にチャイロスズメバチ、クロスズメバチ、シダクロスズメバチが生息。

コガタスズメバチの区別構成割合




スズメバチ5種の区別構成比



コガタスズメバチ発生状況

1983 – 2005



都市でスズメバチが多発する理由

- 宅地開発による生活圏の重なり
- 雜木林の荒廃による生息適地の減少
- 都市緑化による餌資源の増加
- 虫に対する住民の意識変化
- 殺虫剤の使用形態の変化
- 空き缶等の放置による餌資源の増加
- 天敵オオスズメバチの減少



刺傷被害が問題になるハチとは？

スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチなどの**集団生活をするハチ**が、**巣を守るために人を攻撃する**ことがある。

- 刺すのはメス（働きバチと女王バチ）だけで、オスは刺さない。
- 攻撃性の強さは種により異なる他、同じ種であっても状況により異なる。



スズメバチと人の関わり

- 食用として
幼虫は、タンパク源として古くから食用にされてきた。こうした昆虫食文化は、現在も長野県や岐阜県を中心に残されている。
- 薬用として
巣を、“露蜂房”といって漢方で利用してきた他、巣や成虫、生産物を昆虫資源として活用するための研究も進んでいる。
- 害虫として
ミツバチの巣箱を襲う外敵として養蜂家から嫌われている他、果実を食べる害虫としても嫌われている。また、全国各地で刺傷被害が多発しており、時には“死に至ることもある怖い虫”として、人々に嫌われている。

スズメバチによる刺傷被害の発生状況

	コガタ	キイロ	ヒメ	モン	オオ
駆除件数	11410	182	337	279	139
被害件数	820	43	6	15	33
被害人数	871	55	6	15	51
発生率	7.2%	23.6%	1.8%	5.4%	23.7%

1988年－2007年の調査結果（生活衛生センター）

スズメバチによる刺傷被害の発生時期

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	計
コガタ	34	117	209	234	191	35	820
キイロ		5	18	14	5	1	43
ヒメ		1	3	2			6
モン		2	10	1	2		15
オオ		1	5	13	14		33
計	34	126	245	264	212	36	917
	3.7%	13.8%	26.7%	28.8%	23.1%	3.9%	100%

1988年－2007年の調査結果（生活衛生センター）

スズメバチによる刺傷被害の発生原因

	剪定中 草刈中	駆除 作業中	いたずら	近くを通 行・作業	その他 不明	計
コガタ	581	37	51	81	70	820
キイロ	3	8		27	5	43
ヒメ	1	1		3	1	6
モン	3	1		4	7	15
オオ	9	5		19		33
計	597	52	51	134	83	917
	65.1%	5.7%	5.6%	14.6%	9.0%	100%

1988年－2007年の調査結果（生活衛生センター）

攻撃性の強弱に影響する要因

要因	攻撃性の強弱
種の違い	巣巣規模の大きな種ほど攻撃性が強い。
コロニーの発達段階	働きバチの増加と共に攻撃性が強まる。
巣への干渉の程度	巣への干渉（刺激）が強いほど攻撃性が強い。
女王バチの有無	女王バチが中途死亡した直後は巣内が不安定になり攻撃性が強い。
オオスズメバチの飛来	オオスズメバチが飛来すると、襲撃に備えて警戒心が高まり危険。
地理的な要因	巣巣規模が大きくなる温暖な地域の方が、寒冷地より攻撃性が強い。


オオスズメバチの毒針



オオスズメバチの毒囊と毒腺

オオスズメバチの毒針

スズメバチとミツバチの毒針




ハチ刺されと症状

- 一般的には激痛と局所の発赤、腫脹が普通。その他に、尋麻疹や倦怠感、息苦しさを感じることがある。これらの症状は極めて速やかにあらわれる。
局所の発赤、腫脹は2~3日目をピークに1週間程度で軽快するが、その後、しばらくの間かゆみが続く。
- 中程度の症状としては、のどがつまつたような感じや、胸苦しさ、口の渇き、腹痛、下痢、嘔吐、頭痛、めまい、全身の浮腫がみられる。
- 重症になると、意識が混濁するようになり、さらに悪化すると痙攣、失禁、血圧の低下がみられる。さらに症状が悪化するとアナフィラキシーショックにより死亡することがある。

ハチ刺されと症状の発現時期

	発現時期	主な症状
刺傷による物理的刺激	刺傷時	刺傷部の激痛
ハチ毒による反応	刺傷時~数時間以内	刺傷部の痛み、発赤、腫脹
即時型アレルギー反応	刺傷直後~30分 (極めて短時間)	痛みを伴う全身の紅斑、腫疹、腹痛、下痢、嘔吐、けいれん、意識の混濁などの諸症状
遅延型アレルギー反応	刺傷後1日~2日 (まれに数日以降)	局所の発赤、腫脹など (まれに全身症状がでることがある)


ハチアレルギーの作用機序 即時型アレルギー



- 体内に抗原（ハチ毒）が入ってくると、T細胞の表面にある受容体で抗原を認識する。
- ヘルパーT細胞は生活活性因子（サイトカイン）を放出し、B細胞の抗体産生を促す。
- B細胞で產生されたIgE抗体が肥満細胞と結合する（感作の成立）。


ハチアレルギーの作用機序 即時型アレルギー

2 回目のハチ刺傷



- ① 体内に抗原が入ってくると、肥満細胞の表面にあるIgE抗体と結合する。
 - ② 肥満細胞から、ヒスタミンなどの化学伝達物質が体内に放出される。
 - ③ これらの物質の作用で、くしゃみや蕁麻疹などのアレルギー症状が発現する。

ハチ刺傷による反応の違い



- ハチ刺傷による症状は個人差が大きい。
 - ハチの種類、毒の量、刺傷部位、**体調**等により反応が異なる。
 - 過去にハチに刺されて重症になった人は、**抗体検査**を受けて自分の抗体価を知っておくことも大切である。

ハチ毒の主な成分

区分	スズメバチ	アシナガバチ	ミツバチ
アミン類	ヒスタミン セロトニン	ヒスタミン セロトニン	ヒスタミン -
	カテコールアミン	-	-
	アセチルコリン	-	-
	ポリアミン	ポリアミン	ポリアミン
低分子 ペプチド	ハチ毒キニン マストパラン	ハチ毒キニン マストパラン	メリチン MCDペプチド アパミン
酵素類	ホスホリパーゼA	-	ホスホリパーゼA
	ヒアルуронidーゼ	ヒアルуронidーゼ	ヒアルуронidーゼ
	プロテアーゼ	-	-
非酵素蛋白	マンダラトキシン※	-	-

※ オオスズメバチの毒に含まれる


どのような人が危険か？

- 40歳以上の男性.
 - 以前にハチに刺された時症状が重かった.
 - 抗体値が高い.

スズメバチ、アシナガバチの間には**交差性**があるため、いずれの種に刺された場合でも注意が必要である。

ミツバチとは交差性が無いとされているが、必ずしもそうではないようである。

ハチ刺傷と抗体価の変動 HY氏の場合



刺傷被害にあわないためには

- ハチの生息環境では、むやみに山林内に入らない。
- 近くをハチが多数飛んでいたり、周辺を大きな羽音をたててハチが飛び回っている場合は、近くに巣がある可能性がある。
- 集団での活動時には、特に注意が必要となる。
- 常に緊張感を持って、周囲の状況に注意をはらう。
- 刺されにくい服装を心がける。



攻撃を受けやすい色彩と身なり・行動

- 黒色に対して激しく攻撃する。白色、黄色、銀色に対する反応は弱い。
- 純毛や黒い着衣など、ひらひらするものは巣の近くでは攻撃を受けやすい。その他カメラや長靴など黒くて動くものも危険。
- ヘアスプレー、香水などの化粧品、体臭、汗などにも敏感に反応する。
- 手で払ったり、急に向きを変えるなど、横への動きに反応しやすい。
- 巣から数m～10m位の範囲に近づくと、警戒(威嚇)行動をとる。



巣の所在が分かっている場合の対処法

- 巣を見つけたら早めに取り除く。春先の単独営巣期（女王バチ一頭のみの時）には、危険性がほとんどないので駆除も容易。
- 巣に気づいたら、不意に近づいたり、近くで作業をしてハチを刺激しないように注意する。また、いたずらをしてハチを刺激しない。



巣以外の場所での対処法

- ハチの生息環境では、作業前にハチの巣がないかよく確認し、作業中は常に周りの状況に注意を払う。
- 作業中は、ハチを刺激しない白色や黄色の服装で長袖が望ましい。頭部は攻撃を受けやすいので、必ず帽子をかぶり、手には軍手などをはめて、露出部分を少なくする。
- ハチが餌を探っているところでは、ハチを刺激しないようにする。
- 室内や車内にハチが入ってきた場合は、窓を開けて出ていくのを待つ。たたいたり追いかけ回したりしない限り、決して刺すことはない。

刺された時の対処法（重傷の場合）

- アドレナリン携帯自己注射キット（エピペン）を携行している場合は、直ちに自己注射する。
- その場で体を横たえ、脚を少し高くする。
- おう吐がある場合は、顔を横に向けて窒息しないようにする。
- できるだけ速やかに最寄りの医療機関を受診する。その際は、救急車に**救急搬送を依頼**することが望ましい。



症状出現後30分以内（遅くとも60分以内）に注射すれば、死亡者を減少させる効果が期待できる。

刺された時の一般的な対処法

- 速やかに**安全な場所**まで移動し、安静にする。
- 刺傷部位を**流水でよく洗い流す**。
- 毒液を手や器具を使って絞り出す。（決して口では吸わないこと。）
- 虫刺された薬（ステロイド外用薬）を塗る。
- 速やかに**医師の診察**を受ける。



被害の拡大防止のために忌避剤の携帯（スズメバチサラバ）

有効成分はベンジルアルコール（フェニルメタノール）で、食品添加物（香料）にも用いられる。自然界では、花の香気成分として知られている。

噴霧すると、スズメバチがおとなしくなり被害拡大防止に役立つ。

利点：使い勝手が良い
欠点：非常に値段が高い



スズメバチは本当に危険な虫か 生物による死亡者数の比較


区分	2019	2020	2021
X20 毒ヘビ及び毒トカゲとの接触	2	5	5
X23 スズメバチ, ジガバチ及びミツバチとの接触	計	12	11
	男	10	10
	女	2	1
X25 その他の有毒節足動物との接触	—	—	1
W54 犬による咬傷又は打撲	3	3	2
W55 その他のほ乳類による咬傷又は打撲	5	7	6

厚生労働省人口動態調査結果による

まとめ

- スズメバチは私たちにとって特別な存在ではなく、身边に生活している昆虫であることを理解する。
 - スズメバチに限らず、全ての生き物は生態系の中で重要な役割を担っていることを理解する。
 - スズメバチの生態をよく知り、必要以上にこわがらずに上手につきあってゆくことが大切である。
 - 刺傷被害を防止し、被害を最小限にするために、適切な準備や行動を心がける。

スズメバチを巡る食物連鎖



終

ご清聴ありがとうございました。